

①

Föreläsning 3


Kontinuitet

Funktioner vars grafer kan ritas utan att lyfta pennen kallas kontinuerliga.


Definition: Funktion f kontinuerlig i inre punkten c till dess definitionsmängd om

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$


Om $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ej existerar eller inte är $f(c)$ så är f diskontinuerlig i c .



kont. i c
 $(\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c))$



ej kont. i c
 $(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c))$



ej kont. i c
 $(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ finns ej})$

Definition: • f högerkontinuerlig om $\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = f(c)$


• f vänsterkontinuerlig om $\lim_{x \rightarrow c-} f(x) = f(c)$

(Detta ger mening åt kontinuitet i ändpunkter.)

Definition: f kontinuerlig på intervall I om
 - kontinuerlig i varje punkt i I .

(Om definitionsmängd g intervall så talar man ② bara om kontinuerliga funktioner.)

Exempel: Är $f(x) = \frac{1}{x}$ kontinuerlig?



Ja, ty definitionsmängden innehåller g $x=0$. För $x \neq 0$ är $f(x) = \frac{1}{x}$ helt klart kontinuerlig.

Tack vare gränsvärdesregler vi redan nämnt så är $f \pm g$, fg , f/g ($g(c) \neq 0$) och $(f(x))^n$ ($f(c) > 0$ om n jämn) kontinuerliga om f och g är det. (m.a.p. $x=c$)

Sats: Om $f(g(x))$ definierad på intervall innehållande c och om f kontinuerlig i L

och $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$ så

$$\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f(L) = f\left(\lim_{x \rightarrow c} g(x)\right)$$

Beweis: Låt $\varepsilon > 0$ vara givet.

f kontinuerlig i L : Finns $\gamma > 0$ s.a.

$$|y - L| < \gamma \Rightarrow |f(y) - f(L)| < \varepsilon$$

$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$: Givet $\gamma > 0$ så finns

③

$$\delta > 0 \text{ s.a. } |x - c| < \delta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |g(x) - L| < \eta$$

Vi drar alltså slutsatser att det finns

$$\delta > 0 \text{ s.a. } |x - c| < \delta \Rightarrow |f(g(x)) - f(L)| < \varepsilon$$

$y = g(x)$

Betyder $\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f(L)$.



Exempel: $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+1} = ?$

Vet (1) $\lim_{x \rightarrow 0} x+1 = 1$ och (2) $f(t) = \sqrt{t}$

är kontinuerlig i $x=1$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+1} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} (x+1)} = \sqrt{1} = 1$$



Hävbara diskontinuiteter:

Om en funktion f är diskontinuerlig i en punkt på ett sånt sätt att om den odefinieras

i punkten blir kontinuerlig där så har f

en hävbar diskontinuitet där.


Exempel: $f(x) = \begin{cases} x^2 & , x > 1 \\ x & , x < 1 \\ 2 & , x = 1 \end{cases}$

Hävbar diskontinuitet i $x=1$?


Lösning: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$. Definiera om f s

värde i $x=1$ enligt $f(1)=1$. ④

Då blir f kontinuerlig, f har alltså
en hävbar diskontinuitet i $x=1$. □



En funktion av följande typ har inte hävbar
diskontinuitet:



Från och med nu antas slutna ändliga intervall $[a, b]$.

Sats: Om f är kontinuerlig på $[a, b]$ så
är f begränsad där.

Beweis: Vi visar att f är uppåt begränsad.

(Ej nödv.) Bilda $S_n = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b \text{ och } f(x) > n\}$.

f uppåt begränsad om $S_n = \emptyset$ för
något $n \in \mathbb{N}$. (Då är n övre begränsning
till f .)

⑤ Antag motsatsen, d.v.s. $S_n \neq \emptyset \forall n \in \mathbb{N}$.

$S_n \subset [a, b]$ så nedåt begränsad av a .

Fullständighetsaxiomet $\Rightarrow \inf S_n$ existerar

Sätt $x_n = \inf S_n$. Notera att $a \leq x_n$.

$S_n \neq \emptyset \Rightarrow f(x) > n$ nästan $[a, b]$

P.g.a. kontinuitet så gäller detta ett intervall i $[a, b]$. (Detta ligger då i S_n .)

$$\Rightarrow x_n < b$$

$$\Rightarrow f(x_n) \geq n \quad (\text{ty om } f(x_n) < n$$

så $f(x) < n$ till höger om x_n p.g.a.

-kont., d.v.s. $\inf S_n > x_n$, vilket
motsäger $x_n = \inf S_n$)

$S_{n+1} \subset S_n \Rightarrow x_{n+1} \geq x_n \Rightarrow \{x_n\}$ är
växande talföljd. $\{x_n\}$ har övre be-
gränsning b så $\{x_n\}$ konvergerar. (Se
F2 sid. 8.)

$$\text{Låt } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L.$$

$$a \leq x_n < b \Rightarrow a \leq L \leq b \quad (\text{se F2 sid. 10.})$$

$$f \text{ kont. i } L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(L)$$

(Detta är i princip analogt med satsen på sid. 2.)

Å andra sidan, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$
($f(x_n) \geq n$)

Vi har en motsägelse. ⑥
Antagandet $S_n \neq \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}$ är fel
 $\Rightarrow f$ uppåt begränsad. □

(Motsträffande för att betyda f nedåt begränsad.)

Vi behöver satsen för att visa:

Satsen om största och minsta värde:

Om f kontinuerlig på $[a, b]$ så finns
 $p, q \in [a, b]$ s.a. $f(p) \leq f(x) \leq f(q)$
för alla $x \in [a, b]$.

Bevis: Värdomängden $S = \{f(x) : a \leq x \leq b\}$ till f
har övre begränsning enligt föregående sats.

$\Rightarrow$ Fullständighetsaxiomet ger att $\sup S$ finns,
skriv $M = \sup S$.

Antag finns ej $q \in [a, b]$ s.a. $f(q) = M$.

$\Rightarrow g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$ är kontinuerlig på $[a, b]$.

$\Rightarrow$ Finns $K > 0$ s.a. $g(x) = \frac{1}{M - f(x)} \leq K$

för alla $x \in [a, b]$ enl. föregående

sats.

$\Rightarrow f(x) \leq M - 1/K \quad \forall x \in [a, b]$

Motsäger att $M = \sup S$. Motsägelse!

⑦

Finns alltså $q \in [a, b]$ s.a. $f(q) = M$


$$M = \sup S \Rightarrow f(x) \leq f(q) \quad \forall x \in [a, b]$$

(P.S.S. för $f(p) \leq f(x)$.)Notera: $m = f(p)$ minsta värde och $M = f(q)$ största värdeExempel: Har $f(x) = 3 + 2x - x^2$ ett största värde på $[0, 2]$ och i så fall vilket och var?Lösning: f kontinuerlig på sluttet ändligt intervall $[0, 2]$ $\Rightarrow f$ antar på $[0, 2]$ ett största värde enligt satsen (vi har en garanti!)

$$\begin{aligned} f(x) &= 3 + 2x - x^2 = 3 - (x^2 - 2x) = \\ &= 3 - (x^2 - 2x + 1 - 1) = 3 - ((x-1)^2 - 1) = \\ &= 4 - (x-1)^2 \leq 4 = f(1) \end{aligned}$$

för alla $x \in [0, 2]$.Största värdet är 4 och antas i $x=1$. Satsen om mellanliggande värden:Om f är kontinuerlig på $[a, b]$ och s ligger mellan $f(a)$ och $f(b)$ så finns $c \in [a, b]$ sådant att $f(c) = s$.

f är en
samtan-
hängande
kurva



Bevis: Antag $f(a) < s < f(b)$.

Låt $S = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b \text{ och } f(x) \leq s\}$

$a \in S \Rightarrow S \neq \emptyset$
 b övre begränsning till S } $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Fullständighetsaxiomet ger att $\sup S$ finns

Kalla $c = \sup S$.

Antag $f(c) > s \xrightarrow{f(a) < s} c \neq a$

Kontinuitet $\Rightarrow$ Finns $\delta > 0$ s.a. $f(x) > s$
på $\underbrace{(c-\delta, c]}_{\text{förlämnar } f(c) > s}$

$\Rightarrow c-\delta$ övre begränsning till S

Men $c-\delta < c = \sup S$.

Motsägelse, vilket innebär $f(c) \leq s$.

Antag $f(c) < s \xrightarrow{s < f(b)} c \neq b$

Kontinuitet $\Rightarrow$ Finns $\delta > 0$ s.a. $f(x) < s$

⑨

på $[c, c+\delta)$
 c funkar ty $c \neq b$

Öppenbarligen gäller $[c, c+\delta) \subset S$.

Men $c = \sup S$ är övre begränsning till S .

Motsträffelse, vilket innebär $f(c) \geq s$.

Totalt har vi alltså visat $f(c) = s$. $\square$

(Motsträffande bevis i fallet $f(a) > s > f(b)$.)

Exempel: Visa att $x^3 - x - 1 = 0$ har minst en lösning på $[1, 2]$

Lösning: Låt $f(x) = x^3 - x - 1$, kontinuerlig funktion

$$f(1) = 1^3 - 1 - 1 = -1 < 0$$

$$f(2) = 2^3 - 2 - 1 = 5 > 0$$

0 ligger mellan -1 och 5 och f kont.


$\Rightarrow$ Finns $c \in [1, 2]$ s.a. $f(c) = 0$

d.v.s. $c^3 - c - 1 = 0$, d.v.s. c lösning. $\square$

Notera: Satsen om mellanliggande värden

kan ge flera olika c , följande:


$$\begin{aligned} s &= f(c_1) \\ &= f(c_2) \\ &= f(c_3) \\ &= f(c_4) \\ &= f(c_5) \end{aligned}$$



Några jämna övningsuppgifter

19

1.4:4



Discontinuerlig: I $x=1, x=2, x=3, x=4, x=5$


Vänsterkontinuerlig: I $x=4$

Högerkontinuerlig: I $x=2$ och $x=5$

1.4:8

$$f(x) = \begin{cases} x & ; x < -1 \\ x^2 & ; x \geq -1 \end{cases}$$

Låt oss skissa:



Kontinuerlig överallt utom i $x=-1$ (diskontinuerlig).

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} x = \lim_{x \rightarrow -1^-} x = -1 \quad (\text{vänster})$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} x^2 = \lim_{x \rightarrow -1^+} x^2 = 1 \quad (\text{höger})$$

$$f(-1) = (-1)^2 = 1 \Rightarrow \text{Högerkontinuerlig i } x=-1$$

11

1.4: 14 $f(t) = \frac{1+t^3}{1-t^2}$; $t \neq -1$

f är diskontinuerlig i $t = -1$.

Notera att $1+t^3$ har nollställe i $t = -1$

($1+(-1)^3 = 1-1 = 0$) så man kan bryta ut $1+t$ genom t.ex. polynomdivision:

$$\begin{array}{r} t^2 - t + 1 \overline{) t^3 + 1} \\ \underline{-(t^2 + t)} \\ -t + 1 \\ \underline{-(-t)(t+1)} \\ t + 1 \\ \underline{-(t+1)} \\ 0 \end{array}$$

← jämnt ut!

$$\Rightarrow 1+t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(t) &= \frac{1+t^3}{1-t^2} = \frac{(1+t)(1-t+t^2)}{(1+t)(1-t)} = \\ &= \frac{1-t+t^2}{1-t}, \quad t \neq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -1} f(t) &= \lim_{t \rightarrow -1} \frac{1-t+t^2}{1-t} = \frac{1-(-1)+(-1)^2}{1-(-1)} = \\ &= \frac{1+1+1}{1+1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Definiera $f(t) = \frac{3}{2}$ så blir f kontinuerlig i $t = -1$, och formeln för "utvidgningen" blir $f(t) = \frac{1-t+t^2}{1-t}$

1.4:30 Visa $x^3 - 15x + 1 = 0$ har
tre lösningar i $[-4, 4]$.

(12)

Lösning: $f(x) = x^3 - 15x + 1$ kontinuerlig

Låt oss testa att beräkna f i några
punkter:

$$\begin{aligned} f(-4) &= (-4)^3 - 15 \cdot (-4) + 1 = \\ &= -64 + 60 + 1 = -3 < 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-3) &= (-3)^3 - 15 \cdot (-3) + 1 = \\ &= -27 + 45 + 1 = 19 > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-2) &= (-2)^3 - 15 \cdot (-2) + 1 = \\ &= -8 + 30 + 1 = 23 > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^3 - 15 \cdot (-1) + 1 = \\ &= -1 + 15 + 1 = 15 > 0 \end{aligned}$$

$$f(0) = 1 > 0$$

$$f(1) = 1 - 15 + 1 = -13 < 0$$

$$f(2) = 8 - 30 + 1 = -21 < 0$$

$$f(3) = 27 - 45 + 1 = -17 < 0$$


$$f(4) = 64 - 60 + 1 = 5 > 0$$

Enligt satsen om mellanliggande värden
finns p.g.a. teckenväxlingarna nollställen
till f mellan $x = -4$ och $x = -3$, mellan $x = 0$
och $x = 1$ samt mellan $x = 3$ och $x = 4$. $\square$

⑬ A. III: 2 Visa att om $f(x) \leq K$ på

$[a, b)$ och $(b, c]$ och om $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$
så måste $L \leq K$.

Lösning:



Antag $L > K$.

Låt $\varepsilon = \frac{L-K}{2}$. Notera $\varepsilon > 0$.

$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L \Rightarrow$ Finns $\delta > 0$ som uppfyller

$\delta < \max\{b-a, c-b\}$ s.a.


$$0 < |x-b| < \delta \Rightarrow |f(x)-L| < \varepsilon$$

Speciellt gäller i detta fall:

$$\begin{aligned} f(x) &> L - \varepsilon = L - \frac{L-K}{2} = \\ &= \frac{L+K}{2} > \frac{K+K}{2} = K \end{aligned}$$

Detta motäger $f(x) \leq K$

$\Rightarrow L \leq K$ måste gälla!



A. III: 10 Visa $f(x) = |x|$ kontinuerlig på $\mathbb{R}$

Lösning: Låt $\varepsilon > 0$ vara givet.

Vill nu hitta $\delta > 0$ s.a.

(14)

$$|x-a| < \delta \Rightarrow ||x|-|a|| < \varepsilon$$

$$\text{Vi har: } |x| = |(x-a)+a| \leq |x-a| + |a|$$

$$\Rightarrow |x| - |a| \leq |x-a|$$

$$\begin{aligned} \text{och } |a| &= |-a| = |(x-a)+(-x)| \leq \\ &\leq |x-a| + |-x| = |x-a| + |x| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -(|x| - |a|) \leq |x-a|$$

$$\text{Totalt: } \pm (|x| - |a|) \leq |x-a|$$

$$\text{dvs. } ||x| - |a|| \leq |x-a|$$

Om $\delta = \varepsilon$ så gäller att

$$|x-a| < \delta = \varepsilon \Rightarrow ||x| - |a|| \leq |x-a| < \delta = \varepsilon$$

och vi är klara.



Se även RÖ 2 HT09 där jag löst bl.a.

1.4:6 och 1.4:18