


①

Föreläsning 8

Areaberäkningar

Integralen definieras ju som arean av ett område i xy -planet ($\mathbb{R}^2$ i flervariabelanalyspråk). Låt oss titta närmare på denna tillämpning.

Vi räknar arean av områden under x -axeln ($y < 0$) som positiva trots att integralen är negativ där.




$$\int_a^b |f(x)| dx \text{ ger alltid önskad area } A_1 + A_2$$

$$= \underbrace{\int_a^c f(x) dx}_{A_1} - \underbrace{\int_c^b f(x) dx}_{A_2}$$

Arean A av område R mellan $y=f(x)$ och $y=g(x)$ ges av formeln:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx, \text{ se figur:}$$



Detta eftersom arean hos infinitesimala rektangeln
 är $\underbrace{|f(x) - g(x)|}_{\text{höjd } (>0)} \underbrace{dx}_{\text{bredd}}$ som summeras


(eq. integreras) från a till b .

I figuren fås:
$$A = \int_a^c (f(x) - g(x)) dx + \int_c^b (g(x) - f(x)) dx$$

Om $x = f(y)$, $x = g(y)$ så blir formeln

$$A = \int_c^d |f(y) - g(y)| dy$$

(Samma men $x \leftrightarrow y$
och $a \rightarrow c$, $b \rightarrow d$)



Exempel: Arean A av område R mellan

$$y = x^2 - 2x \quad \text{och} \quad y = 4 - x^2$$

Lösning: Inga axlar nämnda så leta skärning
mellan kurvorna: $x^2 - 2x = y = 4 - x^2 \Leftrightarrow$


③

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - (-2)} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 2} =$$

$$= \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{2} = \begin{cases} 4/2 = 2 \\ -2/2 = -1 \end{cases}$$

d.v.s. punkter $(-1, 3)$ och $(2, 0)$. Se figur:



$$4 - x^2 \geq x^2 - 2x \quad \forall x \in [-1, 2]$$

$$\Rightarrow A = \int_{-1}^2 ((4 - x^2) - (x^2 - 2x)) dx =$$

$$= \int_{-1}^2 (4 + 2x - 2x^2) dx = [\text{Analytisk huvudsats}] =$$

$$= \left(4x + x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_{-1}^2 =$$

$$= \left(4 \cdot 2 + 2^2 - \frac{2}{3} \cdot 2^3 \right) - \left(4 \cdot (-1) + (-1)^2 - \frac{2}{3}(-1)^3 \right) =$$

$$= 8 + 4 - \frac{16}{3} + 4 - 1 - \frac{2}{3} = 15 - \frac{18}{3} =$$

$$= 15 - 6 = \underline{\underline{9}}$$



Nå till frågan hur man tar hand om mer komplicerade integraler än de i gröna rutan på s. 317 (s. 302 ff i uppl. 6)

Integrationsmetoder

④

Memorea de s.u. elementära integralerna (d.v.s. antiderivatorna) på sid. 317 (s. 302ff i uppl. 6). Hur går vi vidare med dessa? Vi inför diverse integrationsmetoder:

- Substitution
- Partiell integrering
- Partialbråksuppdelning
- Invers substitution

Substitution: Metoden grundar sig på kedjeregeln.

Sats: Antag g deriverbar på $[a, b]$ som uppfyller $g(a) = A$ och $g(b) = B$.
Antag också att f är kontinuerlig på g 's värdemängd. Då gäller:

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_A^B f(u)du$$

Beweis: Låt F vara antiderivata till f ,
d.v.s. $F'(u) = f(u)$.

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} F(g(x)) = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x)$$

↑
kedjeregeln!

⑤

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \int_a^b f(g(x)) g'(x) dx &= \int_a^b \frac{d}{dx} F(g(x)) dx = \left[\text{Analysens} \right. \\
 &\quad \left. \text{fundamentalsats} \right] \\
 &= F(g(x)) \Big|_a^b = F(g(b)) - F(g(a)) = \\
 &= F(B) - F(A) = F(u) \Big|_A^B = \\
 &= [\text{Analysens fundamentalsats}] = \int_A^B \frac{d}{du} F(u) du = \\
 &= \int_A^B F'(u) du = \int_A^B f(u) du \quad \square
 \end{aligned}$$

Notera:

Fungerar också med substitution i obestämda integraler. Då vill man behålla ursprungsvariabeln:

$$\underbrace{\int f(g(x)) g'(x) dx}_{\text{antiderivatan till } f(g(x))g'(x)} = \left(\int f(u) du \right) \Big|_{u=g(x)}$$

Exempel:

(obestämd integral,
d.v.s. antiderivata)

$$\begin{aligned}
 \int e^x \sqrt{1+e^x} dx &= \left[\begin{array}{ll} u = 1+e^x & (=g(x)) \\ du = e^x dx & (=g'(x)dx) \end{array} \right] = \\
 &= \int \sqrt{u} du = \int u^{1/2} du = \\
 &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C = [\text{sätt in } u = 1+e^x] = \\
 &= \boxed{\frac{2}{3} (1+e^x)^{3/2} + C} \quad \square
 \end{aligned}$$

Exempel:

(bestämd integral)

$$\begin{aligned}
 \int_0^8 \frac{\cos \sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}} dx &= \left[\begin{array}{l} u = \sqrt{x+1} \dots \begin{cases} x=8 \Rightarrow u=\sqrt{9}=3 \\ x=0 \Rightarrow u=\sqrt{1}=1 \end{cases} \\ du = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} dx \end{array} \right] \\
 &= \int_1^3 \cos u \cdot 2 du = 2 \int_1^3 \cos u du = \\
 &= 2 (\sin u) \Big|_1^3 = \boxed{2(\sin 3 - \sin 1)} \quad \square
 \end{aligned}$$

obestämd: Ingen an-
givna gränser

⑥

Partiell integrering: Metoden grundar sig på produktregeln.

Antag $U(x)$ och $V(x)$ deriverbara.

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} (U(x)V(x)) = U(x) \frac{dV}{dx} + V(x) \frac{dU}{dx}$$

↑
Produktregeln!

$$\Rightarrow \int \frac{d}{dx} (U(x)V(x)) dx = \int \left(U(x) \frac{dV}{dx} + V(x) \frac{dU}{dx} \right) dx$$

$$\Rightarrow U(x)V(x) = \int U(x) \frac{dV}{dx} dx + \int V(x) \frac{dU}{dx} dx$$

$$\Rightarrow \boxed{\int U(x) \frac{dV}{dx} dx = U(x)V(x) - \int V(x) \frac{dU}{dx} dx}$$

Alternativt: $\int \underset{\downarrow}{U} \underset{\uparrow}{dV} = UV - \int V dU$ (minnesregel)

Exempel: $\int \underbrace{x^2}_{\downarrow} \underbrace{\sin x}_{\uparrow} dx = \left[\begin{matrix} U = x^2 \\ dU = 2x dx \end{matrix} \cdot \begin{matrix} dV = \sin x dx \\ V = -\cos x \end{matrix} \right] =$
(oberständ)

$$= x^2(-\cos x) - \int (-\cos x) \cdot 2x dx =$$

$$= -x^2 \cos x + 2 \int \underbrace{x}_{\downarrow} \underbrace{\cos x}_{\uparrow} dx =$$

$$= \left[\begin{matrix} U = x \\ dU = dx \end{matrix} \cdot \begin{matrix} dV = \cos x dx \\ V = \sin x \end{matrix} \right] =$$

$$= -x^2 \cos x + 2(x \sin x - \int \sin x dx) =$$

$$= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$$



⑦ Exempel:
(beständ)

$$\int_1^e x^3 (\ln x)^2 dx = \int_1^e \underbrace{(\ln x)^2}_{\downarrow} \underbrace{x^3}_{\uparrow} dx =$$

$$= \left[\begin{cases} U = (\ln x)^2 \\ dU = 2 \frac{\ln x}{x} dx \end{cases}, \begin{cases} dV = x^3 dx \\ V = \frac{1}{4} x^4 \end{cases} \right] =$$

$$= \left((\ln x)^2 \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_1^e - \int_1^e \frac{1}{4} x^4 \cdot 2 \frac{\ln x}{x} dx =$$

$$= \left(\frac{1}{4} x^4 (\ln x)^2 \right) \Big|_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e \underbrace{\ln x}_{\downarrow} \underbrace{x^3}_{\uparrow} dx =$$

$$= \left[\begin{cases} U = \ln x \\ dU = \frac{1}{x} dx \end{cases}, \begin{cases} dV = x^3 dx \\ V = \frac{1}{4} x^4 \end{cases} \right] =$$

$$= \left(\frac{1}{4} x^4 (\ln x)^2 \right) \Big|_1^e - \frac{1}{2} \left((\ln x \cdot \frac{1}{4} x^4) \Big|_1^e - \int_1^e \frac{1}{4} x^4 \cdot \frac{1}{x} dx \right) =$$

$$= \left(\frac{1}{4} x^4 (\ln x)^2 \right) \Big|_1^e - \frac{1}{8} (x^4 \ln x) \Big|_1^e + \frac{1}{8} \int_1^e x^3 dx =$$

$$= \left(\frac{1}{4} x^4 (\ln x)^2 - \frac{1}{8} x^4 \ln x + \frac{1}{32} x^4 \right) \Big|_1^e =$$

$$= \frac{1}{32} \left(x^4 (8 (\ln x)^2 - 4 \ln x + 1) \right) \Big|_1^e =$$

$$= \frac{1}{32} \left(e^4 (8 (\ln e)^2 - 4 \ln e + 1) - 1^4 (8 (\ln 1)^2 - 4 \ln 1 + 1) \right) =$$

$$= \frac{1}{32} (e^4 (8 - 4 + 1) - 1(0 - 0 + 1)) =$$

$$= \boxed{\frac{1}{32} (5e^4 - 1)}$$



Partialbråsuppdelning: Nu vill vi integrera

funktioner av typen $\frac{P(x)}{Q(x)}$ där P, Q är polynom. Kvoten kallas för rationell funktion.

Om $\frac{P(x)}{Q(x)}$ är en komplexerad kvot så

kan man dela upp den i en summa av enklare kvoter genom s.k. partialbråsuppdelning. Denna åstadkoms m.h.a en ansättning.

Exempel: Beräkna $\int \frac{x+4}{x^2-5x+6} dx$

Lösning: Faktorisera nämnaren:

$$\begin{aligned} x^2 - 5x + 6 = 0 &\Leftrightarrow x = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 6} = \\ &= \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - \frac{24}{4}} = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2} = \begin{cases} 3 \\ 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$$

$$\Rightarrow \frac{x+4}{x^2-5x+6} = \frac{x+4}{(x-2)(x-3)} = \text{[ansätt en partialbråsuppdelning]} =$$

$$= \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} =$$

$$= \frac{A(x-3) + B(x-2)}{(x-2)(x-3)} =$$

$$= \frac{(A+B)x + (-3A-2B)}{(x-2)(x-3)}$$

Identifiera täljarna:

$$x+4 = (A+B)x + (-3A-2B)$$

9

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ -3A-2B=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B=1-A \\ -3A-2(1-A)=4 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} B=1-A \\ -A=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B=1+6=7 \\ A=-6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+4}{x^2-5x+6} dx = \int \left(\frac{-6}{x-2} + \frac{7}{x-3} \right) dx =$$

$$= -6 \int \frac{dx}{x-2} + 7 \int \frac{dx}{x-3} =$$

$$= \underline{-6 \ln|x-2| + 7 \ln|x-3| + C} \quad \square$$

Allmänt recept:

Sats: Låt P och Q vara reella polynom och antag att P 's grad är mindre än Q 's.

Då gäller:

(a) Man kan alltid faktorisera Q som

$$Q(x) = k(x-a_1)^{m_1} \cdots (x-a_j)^{m_j} \cdot (x^2+b_1x+c_1)^{n_1} \cdots (x^2+b_kx+c_k)^{n_k}$$

dar $x^2+b_1x+c_1, \dots, x^2+b_kx+c_k$ saknar reella rötter.

(b) Rationella funktionen $\frac{P(x)}{Q(x)}$ kan partialbråksuppdelas enligt:

$$(i) \frac{A_1}{x+a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_m}{(x-a)^m}$$

för faktorer i Q av typen $(x-a)^m$

$$(ii) \frac{B_1x+C_1}{x^2+bx+c} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+bx+c)^2} + \dots + \frac{B_nx+C_n}{(x^2+bx+c)^n}$$

$A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n$
och $C_1, \dots, C_n$ förs
genom ansättning

för faktorer i $\mathbb{Q}$ av typen $(x^2+bx+c)^n$ (10)

Notera: Den partialbräksuppdelade funktionen kan nu integreras med hjälp av metoder vi infört, t.ex. Substitution.

Invers substitution: Substitution "balilänges":

$$\int_a^b f(x) dx = \int_A^B f(g(u)) g'(u) du$$

där $a = g(A)$, $b = g(B)$ ($A = g^{-1}(a)$, $B = g^{-1}(b)$)

Vi ersätter x med något komplicerat, $g(u)$.

Finns inga allmänna regler, men man kan pröva:

- Integraler med $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$):

$$\text{Låt } x = a \sin \theta \Leftrightarrow \theta = \arcsin \frac{x}{a}$$

- Integraler med $\sqrt{x^2 + a^2}$ eller $\frac{1}{x^2 + a^2}$ ($a > 0$):

$$\text{Låt } x = a \tan \theta \Leftrightarrow \theta = \arctan \frac{x}{a}$$

- Integraler med $\sqrt{x^2 - a^2}$ ($a > 0$):

$$\text{Låt } x = \frac{a}{\cos \theta} \Leftrightarrow \theta = \arccos \frac{a}{x}$$

eller alternativt

$$\text{Låt } x = \frac{a}{2}(e^u + e^{-u}) \Leftrightarrow u = \ln\left(\frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}\right), x \geq a$$

(Notera: $\frac{1}{2}(e^u + e^{-u})$ kallas sinas $\cosh u$
"Cosinus hyperbolicus")

- Integraler med $\sqrt{ax+b}$:

$$\text{Låt } x = \frac{1}{a}(u^2 - b) \Leftrightarrow ax + b = u^2 \Leftrightarrow u = \pm \sqrt{ax+b}$$

III

• Integraler med kvoter av polynom i $\sin \theta$ & $\cos \theta$:

Låt $x = \tan \frac{\theta}{2} \Leftrightarrow \theta = 2 \arctan x$

(t.ex. $\int \frac{1}{2 + \cos \theta} d\theta$.)

Notera:

(Hyperboliska
funktioner)

$$\frac{1}{2}(e^u + e^{-u}) \stackrel{\text{def.}}{=} \cosh u, \quad \frac{1}{2}(e^u - e^{-u}) \stackrel{\text{def.}}{=} \sinh u$$

cosinus hyperbolicus sinus hyperbolicus

$$\frac{d}{du} \cosh u = \sinh u, \quad \frac{d}{du} \sinh u = \cosh u$$

"Hyperboliska enhet": $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$

Exempel: Beräkna $\int \frac{dx}{(1 + 9x^2)^2}$

Lösning:

$$\int \frac{dx}{(1 + 9x^2)^2} = \int \frac{dx}{(1 + (3x)^2)^2} =$$

$$= \left[\text{Av typen } \frac{1}{x^2 + a^2} : \begin{cases} 3x = \tan \theta \\ 3dx = (1 + \tan^2 \theta) d\theta \end{cases} \right] =$$

$$= \int \frac{\frac{1}{3}(1 + \tan^2 \theta) d\theta}{(1 + \tan^2 \theta)^2} = \frac{1}{3} \int \frac{d\theta}{1 + \tan^2 \theta} =$$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{d\theta}{1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}} = \frac{1}{3} \int \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} d\theta =$$

$$= \frac{1}{3} \int \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{3} \int \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) d\theta =$$

$$= \frac{1}{6} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta = \frac{1}{6} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) + C$$

$$= \frac{1}{6} (\theta + \sin \theta \cos \theta) + C =$$

$$= \frac{1}{6} \left(\theta + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \right) + C =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{6} \left(\theta + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{\cos^2 \theta / \cos^2 \theta}{\frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}} \right) + C = \quad (12) \\
&= \frac{1}{6} \left(\theta + \tan \theta \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} \right) + C = [3x = \tan \theta] = \\
&= \frac{1}{6} \left(\arctan 3x + 3x \frac{1}{1 + (3x)^2} \right) + C = \\
&= \frac{1}{6} \left(\arctan 3x + \frac{3x}{1 + 9x^2} \right) + C = \\
&= \boxed{\frac{1}{6} \arctan 3x + \frac{1}{2} \frac{x}{1 + 9x^2} + C} \quad \square
\end{aligned}$$

Notera: Alternativt hade vi kunnat låta

$$x = a \sinh u = \frac{a}{2}(e^u - e^{-u})$$

(Funktioner ofta för $\sqrt{x^2 + a^2}$ och $\frac{1}{x^2 + a^2}$, $a > 0$.)

(13)

Några jämna uppgifter

5.7:14 Arean A hos området R mellan

$$y = \frac{4x}{3+x^2} \text{ och } y=1$$

Lösning: Skärning: $\frac{4x}{3+x^2} = y = 1$


$$4x = 3+x^2$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x = 2 \pm \sqrt{2^2 - 3} = 2 \pm 1 = \begin{cases} 3 \\ 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Skärningspunkter $(1, 1)$ och $(3, 1)$

Låt oss göra en graf snarare:



Eftersom $\frac{4x}{3+x^2} \geq 1$ för $x \in [1, 3]$ så får vi:

$$\begin{aligned} A &= \int_1^3 \left(\frac{4x}{3+x^2} - 1 \right) dx = \int_1^3 \frac{4x}{3+x^2} dx - \int_1^3 1 dx = \\ &= \left(2 \ln |3+x^2| \right) \Big|_1^3 - (x) \Big|_1^3 = \\ &= (2 \ln |3+3^2| - 2 \ln |3+1^2|) - (3-1) = \end{aligned}$$

$$= 2 \ln 12 - 2 \ln 4 - 2 =$$

$$= 2 \ln \frac{12}{4} - 2 = \underline{\underline{2 \ln 3 - 2}}$$

(area-
einheit)

(19)

5.6:22

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4+2x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x^2-2x)}} =$$

$$= \left[\begin{array}{l} \text{quadrat-} \\ \text{kompletieren} \end{array} \right] = \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x^2-2x+1)+1}} =$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{5-(x-1)^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{5} \sqrt{1-\left(\frac{x-1}{\sqrt{5}}\right)^2}} =$$

$$= \left[\begin{array}{l} u = \frac{x-1}{\sqrt{5}} \\ du = \frac{1}{\sqrt{5}} dx \end{array} \right] = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{\sqrt{5} du}{\sqrt{1-u^2}} =$$

$$= \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C =$$

$$= \boxed{\arcsin \frac{x-1}{\sqrt{5}} + C}$$

6.1:26

$$\int (\arcsin x)^2 dx = \left[\begin{array}{l} \theta = \arcsin x \Leftrightarrow x = \sin \theta \\ dx = \cos \theta d\theta \end{array} \right]$$

$$= \int \theta^2 \underbrace{\cos \theta}_{\uparrow} d\theta =$$

$$= \left[\begin{array}{l} u = \theta^2 \\ du = 2\theta d\theta \end{array} \right] \left[\begin{array}{l} dv = \cos \theta \\ v = \sin \theta \end{array} \right] =$$

$$= \theta^2 \sin \theta - \int \sin \theta \cdot 2\theta d\theta =$$

$$= \theta^2 \sin \theta - 2 \int \underbrace{\theta}_{\downarrow} \underbrace{\sin \theta}_{\uparrow} d\theta =$$

partiel-
integration

(15)

$$\begin{aligned}
&= \left[\begin{cases} U = \theta & \int dV = \sin \theta d\theta \\ dU = d\theta & V = -\cos \theta \end{cases} \right] = \\
&= \theta^2 \sin \theta - 2 \left(\theta (-\cos \theta) - \int (-\cos \theta) d\theta \right) = \\
&= \theta^2 \sin \theta + 2\theta \cos \theta - 2 \int \cos \theta d\theta = \\
&= \theta^2 \sin \theta + 2\theta \cos \theta - 2 \sin \theta + C = \\
&= \theta^2 \sin \theta + 2\theta \sqrt{1 - \sin^2 \theta} - 2 \sin \theta + C = \\
&= \underline{\underline{(\arcsin x)^2 x + 2(\arcsin x) \sqrt{1 - x^2} - 2x + C}}
\end{aligned}$$

6.2:16 $\int \frac{x^3 + 1}{12 + 7x + x^2} dx = (*)$

Polynomdivision der Integranden:

$$\begin{array}{r}
x-7 \\
\hline
x^3 + 1 \quad | \quad x^2 + 7x + 12 \\
\underline{-x(x^2 + 7x + 12)} \quad (= -x^3 - 7x^2 - 12x) \\
-7x^2 - 12x + 1 \\
\underline{-(-7)(x^2 + 7x + 12)} \quad (= 7x^2 + 49x + 84) \\
37x + 85 \quad \leftarrow \text{restterm}
\end{array}$$

$$\Rightarrow (*) = \int \left(x - 7 + \frac{37x + 85}{x^2 + 7x + 12} \right) dx = (**)$$

Faktorisieren Nenner in Resttermen:

$$\begin{aligned}
x^2 + 7x + 12 &= 0 \\
x &= -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} - \frac{48}{4}} = -\frac{7}{2} \pm \frac{1}{2} = \begin{cases} -3 \\ -4 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow (**) &= \int \left(x - 7 + \frac{37x + 85}{(x+3)(x+4)} \right) dx = \\
&= \frac{1}{2}x^2 - 7x + \int \frac{37x + 85}{(x+3)(x+4)} dx = (+)
\end{aligned}$$

Partiellbråkuppdelning:

$$\begin{aligned} \frac{37x+85}{(x+3)(x+4)} &\stackrel{\text{ansätt}}{=} \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4} = \\ &= \frac{A(x+4) + B(x+3)}{(x+3)(x+4)} = \\ &= \frac{(A+B)x + (4A+3B)}{(x+3)(x+4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{cases} A+B=37 \\ 4A+3B=85 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} B=37-A \\ 4A+3(37-A)=85 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} B=37-A \\ A=85-3 \cdot 37 = 85-111 = -26 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int &= \frac{1}{2}x^2 - 7x + \int \left(\frac{-26}{x+3} + \frac{63}{x+4} \right) dx = \\ &= \frac{1}{2}x^2 - 7x - 26 \int \frac{dx}{x+3} + 63 \int \frac{dx}{x+4} = \\ &= \boxed{\frac{1}{2}x^2 - 7x - 26 \ln|x+3| + 63 \ln|x+4| + C} \end{aligned}$$

6.2:22 $\int \frac{x^2+1}{x^3+8} dx = (*)$

Vi ser att $x=-2$ rot till nämnaren
 (ty $(-2)^3+8 = -2^3+8 = -8+8=0$) så
 $x-(-2) = x+2$ faktorer i x^3+8 :

$$\begin{array}{r} \frac{x^2-2x+4}{x^3+8} \overline{) x+2} \\ \underline{-x^2(x+2)} \quad (= -x^3-2x^2) \\ -2x^2+8 \\ \underline{-(-2x)(x+2)} \quad (= 2x^2+4x) \\ 4x+8 \\ \underline{-4(x+2)} \quad (= -4x-8) \\ 0 \end{array}$$

← jämnt ut!

17

$$\begin{aligned}\Rightarrow x^3+8 &= (x+2)(x^2-2x+4) = \\ &= (x+2)((x^2-2x+1)+3) = \\ &= (x+2)((x-1)^2+3)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (*) = \int \frac{x^2+1}{(x+2)((x-1)^2+3)} dx = (**)$$

Partialbräksuppdelning:

$$\frac{x^2+1}{(x+2)((x-1)^2+3)} \stackrel{\text{ansätt}}{=} \frac{[(x-1)^2+3 \text{ saknar nollställe}]}{(x+2)((x-1)^2+3)} =$$

$$= \frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{(x-1)^2+3} =$$

$$= \frac{(A(x-1)^2+3A) + (x+2)(Bx+C)}{(x+2)((x-1)^2+3)} =$$

$$= \frac{(Ax^2-2Ax+4A) + (Bx^2+(2B+C)x+2C)}{(x+2)((x-1)^2+3)}$$

$$= \frac{(A+B)x^2 + (-2A+2B+C)x + (4A+2C)}{(x+2)((x-1)^2+3)}$$

$$\begin{cases} A+B = 1 \\ -2A+2B+C = 0 \\ 4A+2C = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \end{array} \begin{array}{l} \textcircled{2} \textcircled{-4} \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \sim$$

$\begin{array}{ccc} A & B & C \end{array}$

$$\sim \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -3 \end{array} \begin{array}{l} \textcircled{1} \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \end{array} \begin{array}{l} \\ \leftarrow \\ \boxed{1/3} \end{array} \sim$$

$$\sim \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array} \begin{array}{l} \\ \leftarrow \\ \textcircled{-1} \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 7/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array} \begin{array}{l} \\ \boxed{1/4} \\ \leftarrow \end{array} \sim$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 7/12 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array} \right] \xrightarrow{(-)} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5/12 \\ 0 & 1 & 0 & 7/12 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = 5/12 \\ B = 7/12 \\ C = -1/3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (**) = \int \left(\frac{5/12}{x+2} + \frac{(7/12)x - 1/3}{(x-1)^2 + 3} \right) dx =$$

$$= \frac{5}{12} \int \frac{dx}{x+2} + \frac{1}{12} \int \frac{7x-4}{(x-1)^2+3} dx =$$

$$= \frac{5}{12} \ln|x+2| + \frac{1}{12} \int \frac{7x-4}{(x-1)^2+3} dx =$$

$$= \left[\begin{array}{l} u = x-1 \\ du = dx \end{array} \right] =$$

$$= \frac{5}{12} \ln|x+2| + \frac{1}{12} \int \frac{7(u+1)-4}{u^2+3} du =$$

$$= \frac{5}{12} \ln|x+2| + \frac{1}{12} \int \frac{7u}{u^2+3} du + \frac{1}{12} \int \frac{du}{u^2+3} =$$

$$= \frac{5}{12} \ln|x+2| + \frac{7}{24} \int \frac{2u}{u^2+3} du + \frac{1}{12} \int \frac{du}{(\frac{u}{\sqrt{3}})^2+1} =$$

$$= \frac{5}{12} \ln|x+2| + \frac{7}{24} \ln|u^2+3| + \frac{1}{12} \int \frac{du}{(\frac{u}{\sqrt{3}})^2+1} =$$

$$= \left[\begin{array}{l} v = \frac{u}{\sqrt{3}} \\ dv = \frac{du}{\sqrt{3}} \end{array} \right] = \frac{5}{12} \ln|x+2| + \frac{7}{24} \ln((x-1)^2+3) + \frac{1}{12} \int \frac{\sqrt{3} dv}{v^2+1} =$$

$$= \frac{5}{12} \ln|x+2| + \frac{7}{24} \ln((x-1)^2+3) +$$

$$+ \frac{\sqrt{3}}{12} \arctan v + C =$$

$$v = u/\sqrt{3} = (x-1)/\sqrt{3}$$

(19)

$$= \boxed{\frac{5}{2} \ln|x+2| + \frac{7}{2u} \ln(x^2 - 2x + u) + \frac{\sqrt{3}}{12} \arctan \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C}$$

6.3:30 $\int \frac{dx}{1+x^{1/3}} = \left[\begin{array}{l} x = u^3 \\ dx = 3u^2 du \end{array} \right] =$

$$= \int \frac{3u^2 du}{1+(u^3)^{1/3}} = 3 \int \frac{u^2}{1+u} du = (*)$$

Notera att: $u^2 = u^2 + 2u + 1 - 2u - 1 =$
 $= (u+1)^2 - (2u+1) =$
 $= (u+1)^2 - 2(u+1) + 1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (*) &= 3 \int \frac{(u+1)^2 - 2(u+1) + 1}{u+1} du = \\ &= 3 \int \left((u+1) - 2 + \frac{1}{u+1} \right) du = \\ &= 3 \int \left(u - 1 + \frac{1}{u+1} \right) du = \\ &= 3 \left(\frac{1}{2} u^2 - u + \ln|u+1| \right) + C = [u = x^{1/3}] = \\ &= \boxed{\frac{3}{2} x^{2/3} - 3x^{1/3} + 3 \ln|x^{1/3} + 1| + C} \end{aligned}$$

Se även RÖ 6 HT09 där jag löst bl.a.

6.1:20, 6.2:28, 6.3:32

