



Andra exempeltentan 2010-01-08 kl. 12:15–14:00

Miniräknare: Ej symbolhanterande. Formelsamling: Tabeller och formler för NV- och TE-programmen; Formler och tabeller i fysik, matematik och kemi för gymnasieskolan; TEFYMA; eller Formler och tabeller (Natur och Kultur).

Lösningarna bör vara så pass fullständigt dokumenterade att en läsare kan följa alla moment utan att behöva fylla i saknade steg.

Betyg sätts efter hur väl lärandemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är: A 22p, B 18p, C 14p, D 10p, E 9p. (Max: 24p.) Aspektuppgiften markerad A kan höja betyget om den är löst tillräckligt väl.

- ok! 1. a) Visa med hjälp av den formella definitionen av gränsvärde (d.v.s. med ε - δ -formalism) att $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} e^x = 0$. (1p)

ok! b) Låt *Ta inte detta
baksvarigt!*

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{om } x \leq 0, \\ (x-1)^2 & \text{om } x > 0. \end{cases}$$

Beräkna $f'(x)$ för $x \neq 0$ m.h.a. derivatans informella definition. Är f deriverbar i $x = 0$? (1p)

- ok! 2. Bestäm integralerna nedan.


ok! a) $\int_0^1 x^5 e^{x^3} dx$. (1p)

ok! b) $\int \frac{2x^2+3}{x^3-2x^2+x} dx$. (1p)


ok! c) $\int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{(1+4x^2)^{3/2}}$. (1p)

- ok! 3. Bestäm den generaliserade integralen $\int_{-2}^1 \frac{dx}{x^{4/5}}$. (3p)

- nej! ✗ En halvklotformad vattenskål med diametern 140 cm fylls på med hastigheten 20 kubikcentimeter per sekund. Hur snabbt stiger vattenytan då djupet är 35 cm? (Ledtråd: Se Figur 1 samt notera att ett klotsegment med djupet x har volymen $\pi r x^2 - \frac{1}{3} \pi x^3$ om klotradien är r .) (3p)



Figur 1. Den halvklotformade skålen i Uppgift 4.



Figur 2. Området R och centroiden $(\bar{x}, \bar{y})$ i Uppgift 5.

ok!

5. Bestäm ^{masscentrum} centroiden $(\bar{x}, \bar{y})$ för området R begränsat av kurvorna $x^2 + y^2 = 1$ och $x + y = 1$. (Ledtråd: Se Figur 2.) (3p)

nej!

- X Använd en Maclaurinserieutveckling för att beräkna $\ln 11 - \ln 10$ med fyra decimalers noggrannhet. (Ledtråd: Använd Maclaurin-serien $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$.) (3p)

ok!

7. Visa med induktion att $\sum_{k=1}^n \left(\sum_{\ell=1}^k \ell \right)^{-1} = \frac{2n}{n+1}$ för alla $n \in \mathbb{Z}_+$. (3p)

ok!

8. Bestäm de allmänna lösningarna till differentialekvationerna nedan.

ok!

a) $xy' - 2y = x^3 e^{x^5}$. (2p)

ok!

b) $x^2 y'' + 3xy' + 5y = 0 \quad (x > 0)$. (2p)

nej!

- X Bevisa följande sats:

Sats: (i) Om $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergerar så $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

(ii) Om $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ eller inte existerar så divergerar $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

LÖSNINGAR TILL ANDRA EXEMPELTENTAN

1. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} e^x = 0$ betyder formellt:

För varje $\varepsilon > 0$ finns $R < 0$ s.a.

$$x < R \Rightarrow \left| \frac{1}{x^2} e^x - 0 \right| < \varepsilon$$

$$\text{Det gäller att } \left| \frac{1}{x^2} e^x - 0 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} e^x < \varepsilon \quad (*)$$

Eftersom $e^x < 1$ för $x < 0$ så uppfylls (*) om $\frac{1}{x^2} < \varepsilon$ och $x < 0$.

$$\text{Men } \frac{1}{x^2} < \varepsilon \Leftrightarrow x^2 > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow x < -\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

om $x < 0$ antas. Alltså, välj $R = -\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$.

Då fås

$$x < R \left(= -\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} < 0 \right) \Rightarrow \left| \frac{1}{x^2} e^x - 0 \right| < \varepsilon$$

[ent. ovan]

och vi är klara. □

b) Vi har
$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2, & x \leq 0 \\ (x-1)^2, & x > 0 \end{cases}$$

Vi beräknar derivatan för $x \neq 0$:

• $x < 0$: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h+1)^2 - (x+1)^2}{h} =$

①

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + h^2 + 1^2 + 2xh + 2x + 2h - x^2 - 2x - 1^2}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2xh + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2(x+1)) = \\
&= 2(x+1)
\end{aligned}$$

• $x > 0$: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h-1)^2 - (x-1)^2}{h} =$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + h^2 + 1^2 + 2xh - 2x - 2h - x^2 + 2x - 1^2}{h} = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2xh - 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2(x-1)) = \\
&= 2(x-1)
\end{aligned}$$

Är f deriverbar i $x=0$, d.v.s. finns $f'(0)$?

Vi har (notera $f(0)=1$):

$$\begin{aligned}
f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(h+1)^2 - 1}{h}, & h < 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(h-1)^2 - 1}{h}, & h > 0 \end{cases} = \\
&= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(h^2 + 2h + 1) - 1}{h}, & h < 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(h^2 - 2h + 1) - 1}{h}, & h > 0 \end{cases} = \\
&= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^-} (h+2), & h < 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} (h-2), & h > 0 \end{cases} = \begin{cases} 2, & h < 0 \\ -2, & h > 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

d.v.s $f'(0)$ existerar ej. Då kan inte f vara deriverbar i $x=0$.

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{2.}} \quad a) \int_0^1 x^5 e^{x^3} dx &= \int_0^1 x^3 \cdot x^2 e^{x^3} dx = \int_0^1 u dv \stackrel{\text{P.I.}}{=} \\
 &= (uv) \Big|_0^1 - \int_0^1 v du = \\
 &= \left[\text{Låt } u = x^3, \quad dv = x^2 e^{x^3} dx \right. \\
 &\quad \left. \text{d.v.s. } du = 3x^2 dx, v = \frac{1}{3} e^{x^3} \right] = \\
 &= \left(x^3 \cdot \frac{1}{3} e^{x^3} \right) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{3} e^{x^3} \cdot 3x^2 dx = \\
 &= \left(\frac{1}{3} e - 0 \right) - \int_0^1 x^2 e^{x^3} dx = \\
 &= \frac{1}{3} e - \left(\frac{1}{3} e^{x^3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} e - \frac{1}{3} (e - 1) = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \int \frac{2x^2 + 3}{x^3 - 2x^2 + x} dx &= \int \frac{2x^2 + 3}{x(x^2 - 2x + 1)} dx = \\
 &= \int \frac{2x^2 + 3}{x(x-1)^2} dx = (*)
 \end{aligned}$$

Partialbråkesuppdelning:

$$\begin{aligned}
 \frac{2x^2 + 3}{x(x-1)^2} &\stackrel{\text{ansätt}}{=} \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} = \\
 &= \frac{A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx}{x(x-1)^2} = \\
 &= \frac{A(x^2 - 2x + 1) + B(x^2 - x) + Cx}{x(x-1)^2} = \\
 &= \frac{(A+B)x^2 + (-2A-B+C)x + A}{x(x-1)^2}
 \end{aligned}$$

Vi identifierar:

$$\begin{cases} A + B = 2 & (1) \\ -2A - B + C = 0 & (2) \\ A = 3 & (3) \end{cases}$$

Använd (3) i (1): $3 + B = 2 \Leftrightarrow B = -1$ (4).

Använd (3) och (4) i (2):

$$\begin{aligned} -2 \cdot 3 - (-1) + C &= 0 \Leftrightarrow -6 + 1 + C = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow C &= 6 - 1 = 5 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \Rightarrow (*) &= \int \left(\frac{3}{x} + \frac{-1}{x-1} + \frac{5}{(x-1)^2} \right) dx = \\ &= 3 \ln |x| - \ln |x-1| - \frac{5}{x-1} + C = \\ &= \ln \left| \frac{x^3}{x-1} \right| - \frac{5}{x-1} + C, \quad C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{(1+4x^2)^{3/2}} &= \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{(1+(2x)^2)^{3/2}} = \\ &= \left[\begin{cases} 2x = \tan \theta \\ 2dx = \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \end{cases}, \begin{cases} x = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} + n_1\pi \\ x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4} + n_2\pi \end{cases} \right] = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4} + n_2\pi}^{\frac{\pi}{4} + n_1\pi} \frac{\frac{1}{2} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}}{(1 + \tan^2 \theta)^{3/2}} = [\text{Välj } n_1 = n_2 = 0] = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta (1 + \tan^2 \theta)^{3/2}} = \left[\begin{aligned} 1 + \tan^2 \theta &= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad (\text{trigellan}) \end{aligned} \right] \quad (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta (\frac{1}{\cos^2 \theta})^{3/2}} = [\cos \theta > 0] = \\
&= \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta / \cos^3 \theta} = \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos \theta d\theta = \\
&= \frac{1}{2} (\sin \theta) \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right) = \\
&= \frac{1}{2} \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\approx 0.707)
\end{aligned}$$

3. $\int_{-2}^1 \frac{dx}{x^{4/5}} = [\text{Integrand obegr. i } x=0] =$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-2}^0 \frac{dx}{x^{4/5}} + \int_0^1 \frac{dx}{x^{4/5}} = \\
&= \lim_{b \rightarrow 0^-} \int_{-2}^b \frac{dx}{x^{4/5}} + \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{dx}{x^{4/5}} = \\
&= \lim_{b \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{-\frac{4}{5}+1} x^{-\frac{4}{5}+1} \right) \Big|_{-2}^b + \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{-\frac{4}{5}+1} x^{-\frac{4}{5}+1} \right) \Big|_a^1 = \\
&= \lim_{b \rightarrow 0^-} (5x^{1/5}) \Big|_{-2}^b + \lim_{a \rightarrow 0^+} (5x^{1/5}) \Big|_a^1 = \\
&= 5 \left(\lim_{b \rightarrow 0^-} b^{1/5} - (-2)^{1/5} \right) + \\
&\quad + 5 \left(1 - \lim_{a \rightarrow 0^+} a^{1/5} \right) = \\
&= 5(0 + 2^{1/5}) + 5(1 - 0) = \\
&= 5(2^{1/5} + 1) \quad (\approx 10.7)
\end{aligned}$$



Vattendjup x , radie $r = \frac{140 \text{ cm}}{2} = 70 \text{ cm}$

$$\Rightarrow \text{Vattenvolym } V = \pi r x^2 - \frac{1}{3} \pi x^3 =$$

$$= 70 \pi x^2 - \frac{1}{3} \pi x^3 \quad (*)$$

Vet att $\frac{dV}{dt} = 20 \text{ cm}^3/\text{s}$. Derivera

nu (*) m.a.p. t :

$$\frac{dV}{dt} = 70 \pi \cdot 2x \frac{dx}{dt} - \frac{1}{3} \pi \cdot 3x^2 \frac{dx}{dt} =$$

$$= 140 \pi x \frac{dx}{dt} - \pi x^2 \frac{dx}{dt} =$$

$$= (140 - x) \pi x \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{\frac{dV}{dt}}{(140 - x) \pi x} = [\text{Stoppa in värden}] =$$


$$= \frac{20}{(140 - 35) \pi \cdot 35} = \frac{20}{105 \cdot 35 \pi} =$$

$$= \frac{4}{21 \cdot 35 \pi} = \frac{4}{735 \pi} \text{ cm/s} (\approx 0.0017 \text{ cm/s})$$

(6)

5. Figur:

P.g.a symmetri
måste $\bar{y} = \bar{x}$ för
centroiden $(\bar{x}, \bar{y})$.
Vi beräknar därför
endast $\bar{x}$.



Areaelementet i figuren har
höjden $h(x)$, så vi har:

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$\Rightarrow y = \sqrt{1 - x^2}$$

och

$$x + y = 1$$

$$\Rightarrow y = 1 - x$$

Vilket ger
$$h(x) = \sqrt{1 - x^2} - (1 - x) =$$
$$= \sqrt{1 - x^2} + x - 1, \quad x \in [0, 1].$$

$$\Rightarrow dm = \underbrace{1}_{\text{densitet (ty centroid)}} \cdot dA = dA = h(x) dx =$$

$$= (\sqrt{1 - x^2} + x - 1) dx$$

Detta ger ett momentelement kring $x=0$ om

$$dM_{x=0} = x dm = x (\sqrt{1 - x^2} + x - 1) dx =$$
$$= (x\sqrt{1 - x^2} + x^2 - x) dx$$

Detta ger

$$m = \int dm = \int_0^1 (\sqrt{1-x^2} + x - 1) dx =$$
$$= \underbrace{\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx}_{\text{arean av kvarts-} \\ \text{cirkel m. radie 1}} + \int_0^1 (x-1) dx =$$

$$= \frac{1}{4} \pi \cdot 1^2 + \left(\frac{1}{2} x^2 - x \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} - 1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

$$M_{x=0} = \int dM_{x=0} = \int_0^1 (x\sqrt{1-x^2} + x^2 - x) dx =$$

$$= \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx + \int_0^1 (x^2 - x) dx =$$

$$= \left(-\frac{1}{3} (1-x^2)^{3/2} \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 =$$

$$= -\frac{1}{3} \left((1-1^2)^{3/2} - (1-0^2)^{3/2} \right) + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} =$$

$$= -\frac{1}{3} (0 - 1) + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{M_{x=0}}{m} = \frac{1/6}{\pi/4 - 1/2} = \frac{4}{6(\pi-2)} =$$

$$= \frac{2}{3(\pi-2)} \quad (\approx 0.58)$$

$$\Rightarrow \text{Centroiden } \bar{y} \text{ } (\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{2}{3(\pi-2)}, \frac{2}{3(\pi-2)} \right).$$

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{6.}} \quad \ln 11 - \ln 10 &= \ln \frac{11}{10} = \ln \left(1 + \frac{1}{10}\right) = \\
 &= [\text{Maclaurinserienutveckling}] = \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{1}{10}\right)^n = \\
 &= \frac{1}{10} - \frac{1}{2} \frac{1}{100} + \frac{1}{3} \frac{1}{1000} - \frac{1}{4} \frac{1}{10000} + \dots
 \end{aligned}$$

Fyra decimalers noggrannhet innebär ett fel mindre än $\frac{1}{2} \cdot 10^{-4}$. Vi ser att serien är alternerande vilket innebär att felet till sin storlek vid truncering är högst lika stor som första uteslagna termen. Vi ser att $|\frac{1}{4} \frac{1}{10000}| = \frac{1}{4} \cdot 10^{-4} < \frac{1}{2} \cdot 10^{-4}$, så vi kan ta de tre första termerna:

$$\begin{aligned}
 \ln 11 - \ln 10 &\approx \frac{1}{10} - \frac{1}{2} \frac{1}{100} + \frac{1}{3} \frac{1}{1000} = \\
 &= \frac{1}{10} - \frac{1}{200} + \frac{1}{3000} = \frac{300 - 15 + 1}{3000} = \\
 &= \frac{286}{3000} = \frac{143}{1500} = 0.09533333...
 \end{aligned}$$

(korrekt till fjärde decimalen).

(Notera i Exakt svar: 0.0953101798...)

7. Vi noterar först att

$$\sum_{k=1}^k l = 1+2+3+\dots+(k-1)+k = \\ = \frac{1}{2}k(k+1)$$

$$\begin{aligned} \text{(ty } 1+2+\dots+k &= \frac{1}{2}(1+2+\dots+k) \\ &= \frac{1}{2}((k+1)+\dots+(k+1)) = \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{k \text{ termer}} \\ &= \frac{1}{2}k(k+1) \end{aligned}$$

Alltså kan påståendet skrivas:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}k(k+1) \right)^{-1} = \frac{2n}{n+1}$$

$$\text{d.v.s. } \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} = \frac{2n}{n+1}$$

$$\text{Så att } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$$

$$\text{Låt } VL_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \text{ , } HL_n = \frac{n}{n+1}$$

Ska visa $VL_n = HL_n \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+$.

$$\bullet \text{ Startsteg: } \begin{cases} VL_1 = \sum_{k=1}^1 \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \cdot (1+1)} = \frac{1}{2} \\ HL_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{d.v.s. } VL_1 = \frac{1}{2} = HL_1, \text{ startsteg verifierat.}$$

(10)

• Induktionssteg: Ska visa implikationen

$$\underbrace{VL_p = HL_p}_{\text{induktionsantagande}} \Rightarrow VL_{p+1} = HL_{p+1} \quad \forall p \in \mathbb{Z}_+$$

Antag därför $VL_p = HL_p$. Då fås:

$$VL_{p+1} = \sum_{k=1}^{p+1} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^p \frac{1}{k(k+1)} + \underbrace{\frac{1}{(p+1)(p+2)}}_{\text{term } k=p+1}$$

$$= VL_p + \frac{1}{(p+1)(p+2)} = [\text{Ind. ant.}] =$$

$$= HL_p + \frac{1}{(p+1)(p+2)} =$$

$$= \frac{p}{p+1} + \frac{1}{(p+1)(p+2)} =$$

$$= \frac{p(p+2) + 1}{(p+1)(p+2)} = \frac{p^2 + 2p + 1}{(p+1)(p+2)} =$$

$$= \frac{(p+1)^2}{(p+1)(p+2)} = \frac{p+1}{p+2} =$$

$$= \frac{p+1}{(p+1)+1} = HL_{p+1},$$

d.v.s. induktionssteget verifierat.

Induktionsprincipen ger att $VL_n = HL_n \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+$.

8. a) $xy' - 2y = x^3 e^{x^5}$

$$y' - \frac{2}{x}y = x^2 e^{x^5}$$

Multiplitera med integrerande faktor e^{-u}

$$\text{där } \mu = \int \frac{2}{x} dx = 2 \ln|x| \Rightarrow e^\mu = x^2 \\ \Rightarrow e^\mu = e^{2 \ln|x|} = |x|^2 = x^2$$

Detta ger:

$$x^2 y' - 2xy = x^4 e^{x^5} \\ \frac{d}{dx}(x^2 y) = x^4 e^{x^5} \\ x^2 y = \int x^4 e^{x^5} dx = \\ = \frac{1}{5} e^{x^5} + C \\ y = \frac{1}{5x^2} e^{x^5} + \frac{C}{x^2}$$

b) $x^2 y'' + 3xy' + 5y = 0 \quad (x > 0)$

Vi ser att detta är en Eulerekvation.

$$\left(\text{ty } \underbrace{x^2 \frac{dy^2}{dx^2}}_{\uparrow} + \underbrace{3x^1 \frac{dy^1}{dx^1}}_{\uparrow} + \underbrace{5x^0 \frac{dy^0}{dx^0}}_{\uparrow} = 0 \right)$$

Karakteristiska ekvation:

$$r(r-1) + 3r + 5 = 0$$

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \Rightarrow r = -1 \pm \sqrt{1-5} = -1 \pm 2i$$

Då måste den allmänna lösningen vara

$$y = C_1 |x|^{-1} \cos(2 \ln|x|) + C_2 |x|^{-1} \sin(2 \ln|x|) = \\ = \frac{C_1}{x} \cos(2 \ln x) + \frac{C_2}{x} \sin(2 \ln x)$$

A. Se Föreläsning 9 s. 10ff.

Errata för Andra exempeltentan

Uppg. 8 a), d.v.s.

$$xy' - 2y = x^3 e^{x^5}$$

ska snarare formuleras

$$xy' - 2y = x^7 e^{x^5} \text{ eller } xy' - 2y = x^3 e^x$$

för att det ska kunna gå att integrera. Detta p.g.a. att det längst upp på sid. 12 ska stå

$$\mu = \int \left(-\frac{2}{x} \right) dx \text{ och inte } \mu = \int \frac{2}{x} dx ;$$

man får då I.F. e^μ lika med x^{-2} och inte lika med x^2 .

